

暑い日が続いています。子どもたちは、暑さの中でも夢中で遊ぶので、水分補給や休憩をとるなど体調には十分に気を配りましょう。また、8月に入り県内でのコロナウイルスの感染者数が1800人を超える大流行となってきました…。すでに感染予防対策については、周知していることとは思いますが、ご家庭でも、改めて感染予防対策について見直してみましょう。

新型コロナウイルス蔓延防止のためのお願い

- ・登園前に37.5℃以上の発熱、呼吸器症状(咳・痰・鼻水等)、腹部症状(下痢・嘔吐・食欲不振)、体がだるい等不調がある時は、登園を控え、自宅療養や病児・病後児保育園を利用する等をし、他の子ども達にうつさない配慮をお願いします。
- ・発熱が認められた場合は解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは受け入れできません。(保育園で発熱し早退した次の日は受け入れできません。)
- ・同居家族に発熱、体調不良がみられる時は担任へお知らせください。
- ・**家族内で感染者や濃厚接触者がいる場合は、速やかに保育園へ連絡をお願いします。同居している園児の登園は控えるようお願いします。**



頭じらみ

保育園で頭じらみが発生しましたので、お知らせいたします。
頭じらみは清潔、不潔とは無関係で感染性のものです。



●駆除方法●

- ①成虫にはスミスリンシャンプーが効果あります。指示通り使用すれば、成虫はいなくなります。
- ②卵には、スミスリンは効きません。卵の付いている毛はカットするか、卵を爪でしごくようにして取ります。ビニール袋で密閉して捨てます。
- ③髪は毎日洗髪して、目の細かい「すきぐし」で十分に髪をすいてあげます。
その場合、布団やじゅうたんの上ですくのは避けましょう。しらみは落ちてても2~3日は生きていますので、すぐに髪についてしまいます。
- ④頭髪から落ちた頭じらみが、再び髪の毛につかないよう下着、シーツ、枕カバー、パジャマは毎日取り替え、部屋も念入りに掃除して下さい。布団も日に干して掃除機をかけます。

●おねがい●

- ・髪の毛に頭じらみの卵を発見したら、保育園に必ず知らせて下さい。
- ・頭じらみが見つかった園児は、布団、帽子は毎日持ち帰りその都度洗濯をお願いします。
- ・スミスリンシャンプーは3日に一度ずつ(2日おきに)、3~4回繰り返し行うようにしましょう。卵は硬い殻に覆われていて、約7日で孵化しますから、少なくとも3回の処理が必要です。